



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

BŐR ALATTI TÁLYOG FELTÁRÁSÁRÓL

TÁJ/1306

Tisztelt Betegünk!

A beavatkozáshoz, melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről-

A betegség

Panaszai és az elvégzett vizsgálatok az Ön esetében tályogot igazoltak.

Ez az érintett területen, a zsírral és kötőszövettel kitöltött tér bakteriális fertőződése által okozott gyulladással besűrűsödés. Ez a folyamat előrehaladtával beolvad, sokszor 50-100 ml gennyet tartalmazó tályoggá alakul. A fertőzés az esetek döntő többségében a bőr baktérium- környezetéből ered. Fertőzésre hajlamosít a cukorbetegség, a leromlott általános állapot, az immunműködés rendellenessége. Általában a szőrtüsző, izzadság, ill. faggyúmirigy, vagy egy bőrsérülés a fertőzés forrása. Ezek a tályogok általában felszínesek, közvetlenül a bőr alatt helyezkednek el.

A betegség veszélyei és a kezelés módjai

Elhanyagolt esetekben a tályog spontán a bőr felszínére törhet. A beolvadás első jelénél feltárást kell végezni a folyamat minél sürgősebb lokalizálása érdekében. A feltárás kiterjed a gyakran többrekeszes tályog minden zugára, megfelelő kivezetést és fertőtlenítő oldattal történő öblítési lehetőséget biztosítunk. Szükségessé válhat antibiotikum adása is. A gyógyulás elhúzódása, tartós vérmérgezés esetén visszamaradó tályog lehetőségére vetődik fel, ilyenkor az újabb feltárás, a kezelésből kimaradt területek kitisztítása elengedhetetlen. Csupán antibiotikum kezeléssel nem lehet az ilyen eseteket megoldani.

Műtéti eljárások

A tályogot helyi érzéstelenítésben, általános érzéstelenítésben, meghatározott esetekben gerincvelői érzéstelenítésben tárjuk fel. A bőrön a gyulladt területen bőrmetszést ejtünk, szükség esetén többet is. A tályogüreg rekeszeit összenyitjuk, a gennygyülemet kiürítjük. A tályogüreget megfelelő fertőtlenítő oldattal kiöblítjük és szükség esetén csövet helyezünk az üregbe.

Lehetséges szövődmények:

Vérzés, utóvérzés:

A műtét során megfelelő módszerekkel a vérzéseket csillapítjuk, mégis néhány százalékban előfordulhat utóvérzés. Ebben az esetben szükség lehet a műtéti terület újbóli feltárására és a vérzés műtéti csillapítására. Egyes esetekben műtét nélkül is elérhető a vérzés megállása. Elvértve szükség lehet vér és / vagy vérkészítmény adására.

Sebváladékozás:

A műtéti sebet nyitva kezeljük, ennek megfelelően a sebüreg váladékozik.

Thromboemboliás szövődmények:

Mint minden műtéti beavatkozásnál, ezen műtételnél is a nagyobb vénákban vérrög (trombózis) alakulhat ki, mely leszakadva egy másik ér ürterét elzárhatja (embólia).

Megelőzésére véralvadásgátló anyagot – kis molekulású heparin injekciót a has bőre alá – adunk, mely vérkeringéshez, egyes esetekben súlyos véralvadási zavarhoz vezethet.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ BŐR ALATTI TÁLYOG FELTÁRÁSÁRÓL

TÁJ/1306

Tályog megmaradása:

Az akut gyulladás lezajlása után megmaradhat tályog, illetve tovább is terjedhet. Legsúlyosabb esetben általános vérmérgezés alakul ki.

A beavatkozás körüli időszak jellemzői:

A beavatkozás után:

- a műtétet követően infúzióban folyadékpótlást kap, fájdalmát csillapítjuk, pulzusát, vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük. Esetleges egyéb kísérőbetegségei további ellenőrzéseket tehetnek szükségessé
- a műtétet követő 24 órán belül segítséggel felkelhet
- a műtét utáni első napon folyadékot, majd normál étrendet fogyaszthat
- a sebet napi rendszerességgel kötni kell
- az első napokban orvos által fertőtlenítő oldattal a sebet ki kell tisztítani
- beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket.

Gyógyulási kilátások:

A műtéti feltárásnak kicsi a kockázata, nem változtatja meg az operált aktivitását, munkaképességét. Műtét után a kórházban tartózkodási idő általában 1-3 nap, a műtét előtti aktivitás visszatérése általában 1-3 nap múlva várható. Mindezeket természetesen kísérőbetegség(ek) megléte, az esetleges szövődmények, a beteg állapota és munkaköre befolyásolhatják.

Kijelentem, hogy a vizsgálat jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem. A vizsgálat elvégzésébe beleegyezek.

Karcag, 20.....

.....

a felvilágosítást végző orvos aláírása

.....

a beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanuk:

1.

név

2.

név

Lakcím:

.....

Lakcím:.....

.....

.....

aláírás

.....

aláírás